

THÔNG BÁO

Tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

Ngày 13/2/2020 UBND xã đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Kbang tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng nói chung và trên cây sắn nói riêng. Tính đến ngày 13/2/2020 hiện có 20 ha sắn trồng mới, trong đó đã có 3 ha diện tích đã bị nhiễm bệnh khảm lá virus và gây hại chủ yếu trên trà sắn trồng vụ Đông xuân 2019-2020 (cây sắn 1,5 đến 02 tháng tuổi), tỷ lệ hại chiếm 15 - 20%. Giống bị nhiễm bệnh chủ yếu là KM 98-5, KM 140, KM 419.

Bệnh khảm lá virus hại sắn có tên khoa học là *Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMVV)*, lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng *Bemisia tabaci* và qua hom giống nên khả năng lây lan rất nhanh; hiện tại chưa có thuốc đặc hiệu để phòng trừ, do vậy phòng trừ bằng cách tiêu hủy nguồn bệnh.

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh, Ủy ban nhân dân xã thông báo triệu chứng gây hại, các giải pháp phòng trừ và dự báo sự lây lan của bệnh khảm lá trên cây sắn như sau:

1. Triệu chứng gây hại:

Triệu chứng đặc trưng để nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lổ trên lá. Mức độ hại nhẹ là không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ, mức độ hại nặng làm cho lá sắn xoắn, cong queo, nhăn nhúm. Hom giống lấy từ cây sắn bị bệnh khi mọc mầm sẽ biểu hiện bệnh ngay và không cho thu hoạch; khi cây sắn còn non bị nhiễm virus cũng không cho thu hoạch; cây sắn đã lớn mới nhiễm virus vẫn biểu hiện bệnh nhưng nhẹ hơn, làm năng suất, chất lượng giảm. Triệu chứng bệnh xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây sắn, từ 2 tháng tuổi trở đi cho thấy virus lây nhiễm từ khi cây sắn còn non.

2. Dự báo tình hình của bệnh khảm lá virus trong thời gian tới

Dự báo thời tiết trong thời gian tới tiếp tục nắng hạn, đêm và sáng sớm có sương mù nhiều, là điều kiện rất thích hợp để bọ phấn trắng phát triển và lây lan bệnh. Vì vậy nếu không chủ động phòng trừ và tiêu hủy những cây sắn đã bị nhiễm bệnh sẽ rất dễ lây lan ra diện rộng trên địa bàn xã Đăkhlơ nói riêng và diện tích mỳ toàn huyện nói chung.

3. Các giải pháp phòng trừ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho người trồng sắn nhận thức được tác hại của bệnh khảm lá virus hại sắn và các giải pháp phòng trừ do cơ quan chuyên môn hướng dẫn.
- Chuyển những diện tích trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá do virus sang trồng các loại cây trồng khác như ngô, đậu đỗ, mía ... ít nhất 01 năm mới trồng sắn trở lại.
- Hướng dẫn nông dân trồng sắn đúng thời vụ (dự báo mưa của Trung tâm Khí tượng khu vực), làm đất kỹ 2-3 lần trước khi trồng, đất đủ độ ẩm tốt mới tiến hành trồng; bón phân cân đối phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây giúp cho cây sắn sinh trưởng,

Đề nghị các trưởng làng tiếp tục điều tra rà soát nắm chắc diện tích sản trên địa bàn, nếu phát hiện có xuất hiện bệnh khảm lá virus hại sản cần triển khai ngay các biện pháp nêu trên. Kiểm soát chặt chẽ nguồn hom giống sản đưa vào sản xuất. Tuyệt đối không được lấy hom giống từ những ruộng sản đã bị nhiễm bệnh để sản xuất cho vụ tới.

Báo có diện tích bệnh khảm lá sản về UBND xã (qua Đ/c Loan) để tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn huyện biết và chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Đảng Ủy; UBND xã (thay B/C);
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Trưởng các thôn, làng;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Nhật Linh